

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Крепыш»»

Беседа для родителей:

**«Вопросы вакцинации детей»**

Разработала: Садовая Г.М.  
медсестра

вакцина	Противопоказания для
Все вакцины	Сильная реакция или осложнение на предыдущую прививку
Все живые вакцины	Иммунодефицитные состояния (первичные, вторичные, приобретенные), злокачественные новообразования
ОПЧ вакцина	ВИЧ, все работы по уходу за больными с ВИЧ-инфекцией
АДС-к	Абсолютных противопоказаний нет
АДС-М	Прогрессирующее заболевание черной кожей, а также астма, аллергия и аллергические заболевания
АДЖВ (живая коревая вакцина)	Абсолютных противопоказаний нет
АДЖВ (живая паротитная вакцина)	Абсолютных противопоказаний нет

г. Новокузнецк,

январь 2023г.

# КОНСУЛЬТАЦИЯ: ВОПРОСЫ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ

## ПОДГОТОВИМ МАЛЫША К ПРИВИВКЕ

Главное правило для проведения любой прививки – ребенок должен быть здоровым и в хорошем настроении. Перед первой АКДС рекомендуется сдать общий анализ крови и мочи, а также получить консультацию невропатолога.

**ВАЖНО!** В дни вакцинации не менять привычную схему питания, в т.ч. рацион мамы при грудном вскармливании. Следить за состоянием малыша, температурой. Соблюдать установленный режим сна. Постарайтесь успеть вакцинироваться во время привычного для малыша

бодрствования. Составьте список вопросов относительно вакцинации. После прививки АКДС, даже при хорошем самочувствии малыша, дайте ему жаропонижающее, обеспечьте спокойную обстановку.

## ДОЛЖНО НАСТОРОЖИТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?

- повышение температуры малыша до 38,5° С и выше, судороги,
- возникновение реакции на месте введения вакцины (припухлость, уплотнение, покраснение),
- катар дыхательных путей,
- аллергические реакции на коже.

## МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ

вакцина	противопоказания
Все вакцины	Сильная реакция или осложнение на предыдущую дозу
Все живые вакцины	Иммунодефицитные состояния (первичное), иммуносупрессия, злокачественные новообразования
БЦЖ вакцина	ВИЧ, вес ребенка менее 2 кг, сильные реакции на предыдущее введение
ОПВ (оральная полиомиелитная вакцина)	Абсолютных противопоказаний нет
АКДС	Прогрессирующее заболевание нервной системы, афебрильные судороги в анамнезе (вместо АКДС вводят АДС) тяжелые аллергические заболевания
АДС, АДСМ	Абсолютных противопоказаний нет
ЖКВ (живая коревая вакцина) ЖПВ (живая паротитная вакцина)	Тяжелые реакции на аминогликозиды Анафилактические реакции на яичный белок

Плановая вакцинация откладывается до окончания острых проявлений заболевания и обострения хронических заболеваний. При тяжелых ОРЗ, острых кишечных заболеваниях и др. прививки проводятся сразу же после нормализации температуры тела.

\*- сильной реакцией является наличие температуры выше 40° С, в месте введения вакцины – отек, покраснение больше 8 см в диаметре, наличие реакции анафилактического шока.

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

Сроки проведения	Вакцина
Первые 12 часов	Первая вакцинация против вирусного гепатита В
Новорожденные (3-7 дней)	Вакцинация против туберкулеза
1 месяц	Вторая вакцинация против вирусного гепатита В
3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, <i>гемофильной инфекции</i>
4,5 месяца	Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, <i>гемофильной инфекции</i>
6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита Третья вакцинация против вирусного гепатита В, <i>гемофильной инфекции</i>
12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
18 месяцев	Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, <i>гемофильной инфекции</i>
20 месяцев	Вторая ревакцинация против полиомиелита
6 лет	Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита
7 лет	Ревакцинация против туберкулеза Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка
13 лет	Вакцинация против краснухи (девочки) Вакцинация против вирусного гепатита В (ранее не привитые)
14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка Ревакцинация против туберкулеза Третья ревакцинация против полиомиелита